






Germicide Wirkstoffkombinationen

(32)

Publication number: DE4229707**Publication date:** 1994-03-10**Inventor:** SCHMUCKER ROBERT DR (DE); SAUERMAN
GERHARD DR (DE); TRAUPE BERND (DE); SCHMIDT-
LEWERKUEHNE HARTMUT DR (DE); KLEIN
WINFRIED DR (DE); MATTHIES EVA (DE)**Applicant:** BEIERSDORF AG (DE)**Classification:****- international:** C07D233/64; A01N43/50; A01N63/02; A61K8/00;
A61K8/44; A61K8/49; A61K8/64; A61Q5/02;
A61Q15/00; C07D233/00; A01N43/48; A01N63/02;
A61K8/00; A61K8/30; A61Q5/02; A61Q15/00; (IPC1-7):
A61K37/02; A61K7/32; A61K31/415**- european:** A01N63/02; A61K7/32M6; A61K7/48C26F**Application number:** DE19924229707 19920905**Priority number(s):** DE19924229707 19920905**Also published as:** WO9405156 (A1)
 EP0658082 (A1)
 EP0658082 (A0)
 EP0658082 (B1)
 AU670966B (B2)**Report a data error here****Abstract of DE4229707**

Combinations of imidazol and/or one or more imidazol derivatives with general structural formula (I) in which the residues may be as follows: R1 = H, C(1 - 25) alkyl, R2 = H, C(1 - 25) alkyl, R3 = H, C(1 - 25) alkyl, R4 = H, C(1 - 25) alkyl, where R4 may also, and preferably when R1, R2 and R3 are a hydrogen atom, be the residues -CH2-CH2-NR5R6 and -CH2-CH(NR5R6)-COOR7, where R5 = H, C(1 - 25) alkyl, R6 = H, C(1 - 25) alkyl, R7 = H, C(1 - 25) alkyl, and of a substance active against micro-organisms or a mixture from the lantibiotics group.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 42 29 707 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁵:
A 61 K 37/02
A 61 K 31/415
A 61 K 7/32

DE 42 29 707 A 1

②1 Aktenzeichen: P 42 29 707.9
②2 Anmeldetag: 5. 9. 92
④3 Offenlegungstag: 10. 3. 94

⑦1 Anmelder:
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

⑦2 Erfinder:
Schmucker, Robert, Dr., 2000 Hamburg, DE;
Sauermann, Gerhard, Dr., 2351 Wiemersdorf, DE;
Traupe, Bernd, 2000 Hamburg, DE;
Schmidt-Lewerkühne, Hartmut, Dr., 2000 Hamburg,
DE; Klein, Winfried, Dr., 2000 Hamburg, DE;
Matthies, Eva, 2000 Hamburg, DE


⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 39 38 140 A1
DE 35 23 478 A1
DE 34 40 423 A1
DE 29 48 947 A1
EP 3 42 486 A1
EP 89 12 399
WO 90 09 739

SAHL, H.-G.: Kationische, Lanthionin-haltige
Peptidantibiotika. In: forum mikrobiologie 9/87,
S.330-339;
Chemical Abstracts: Vol. 80, 1974, Ref. 35759h;
Vol.102, 1985, Ref.209360m;

⑤4 Germicide Wirkstoffkombinationen

⑤7 Kombinationen aus Imidazol und/oder einem oder mehre-
ren Derivaten des Imidazols, welche folgende allgemeine
Strukturformel aufweisen



und einem gegen Mikroorganismen wirksamen Stoff oder
einem Gemisch aus der Gruppe der Lantibiotika.

- wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

R₁ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl,

R₂ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl,

R₃ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl,

R₄ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl bedeuten,

- wobei R₄ auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R₁, R₂ und
R₃ ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste

-CH₂-CH₂-NR₅R₆

und -CH₂-CH(NR₅R₆)-COOR₇

repräsentieren kann, wobei

R₅ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl,

R₆ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl,

R₇ = H, C₍₁₋₂₅₎-Alkyl bedeuten,

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

DE 42 29 707 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Wirkstoffkombinationen zum Schutze gegen Mikroorganismen. Ferner betrifft sie Zubereitungen, vorzugsweise kosmetische und dermatologische Zubereitungen, insbesondere kos-

5

Wirkstoffkombinationen zum Schutze gegen Mikroorganismen werden beispielsweise in Zubereitungen verwendet, welche auf die Haut oder Schleimhaut eines Menschen oder eines Tieres aufgetragen werden, um auf

10

Allerdings wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch der Schutz gegen Mikroorganismenbefall von Zubereitungen selbst, insbesondere von kosmetischen und dermatologischen Zubereitungen als Schutz gegen Mikroorganismen angesehen. In der Fachsprache wird dieser Schutz als Konservierung bezeichnet. Konservierung ist an sich nicht auf kosmetische oder dermatologische Zubereitungen beschränkt. Vielmehr bezieht sie sich auf den Schutz aller organischen Materialien gegen mikrobiellen Abbau.

15

Kosmetische Zubereitungen zum Schutze gegen Mikroorganismen sind in erster Linie Desodorantien, also Formulierungen, welche dazu dienen, Körpergeruch zu beseitigen. Körpergeruch entsteht, wenn der an sich geruchlose frische Schweiß durch Mikroorganismen zersetzt wird. Dabei entsteht eine große Anzahl leichtflüchtiger Substanzen, beispielsweise nur genannt die übelriechende iso-Valeriansäure.

20

Desodorantien

Den kosmetischen Desodorantien des Standes der Technik liegen unterschiedliche Wirkprinzipien zugrunde.

25

Durch Adstringentien — vorwiegend im Gebrauch sind Aluminiumsalze wie Aluminiumhydroxychlorid — kann die Entstehung des Schweißes unterbunden werden. Abgesehen davon, daß die damit verbundene Denaturierung der Hautproteine eine unerwünschte Nebenreaktion darstellt, greifen die dafür verwendeten Stoffe zudem in den Wärmehaushalt der Haut ein und sollten allenfalls in Ausnahmefällen angewandt werden.

30

Durch antimikrobielle Stoffe kann die Bakterienflora auf der Haut reduziert werden. Dabei sollten im Idealfalle nur die Geruch verursachenden Mikroorganismen vernichtet werden. In der Praxis hat sich aber herausgestellt, daß die gesamte Mikroflora der Haut in gleichem Maße geschädigt wird. Gelegentlich werden sogar die Mikroorganismen, die keinen Geruch verursachen, stärker geschädigt.

Schließlich kann Körpergeruch auch durch Duftstoffe überdeckt werden, die klassische Methode, die aber am wenigsten den ästhetischen Bedürfnissen des Verbrauchers gerecht wird, da die Mischung aus Körpergeruch und Parfümduft eher unangenehm riecht.

35

Desodorantien sollen folgende Bedingungen erfüllen:

- 1) Die biologischen Vorgänge der Haut dürfen nicht beeinträchtigt werden.
- 2) Die Desodorantien sollen keinen ausgeprägten Eigengeruch besitzen.
- 3) Sie müssen bei Überdosierung oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Anwendung unschädlich sein.
- 4) Sie sollen sich nach wiederholter Anwendung nicht auf der Haut anreichern.
- 5) Sie sollen sich gut in handelsübliche kosmetische Formulierungen einarbeiten lassen.

40

Bekannt und gebräuchlich sind sowohl flüssige Desodorantien, beispielsweise Aerosolsprays, Roll-ons und dergleichen als auch feste Zubereitungen, beispielsweise Deo-Stifte ("Sticks"), Puder, Pudersprays Intimreinigungsmittel usw.

45

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es also, kosmetische Desodorantien zu entwickeln, die die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweisen. Insbesondere sollten die Desodorantien die Mikroflora der Haut weitgehend schonen, die Mikroorganismen aber, die für den Körpergeruch verantwortlich sind, selektiv reduzieren.

50

Topische Dermatika

Einige der unangenehmen oder pathogenen Keime befallen die verschiedenen Schichten der Haut, darunter der Akneerreger *Propionibacterium acnes*. *P. acnes* besiedelt bevorzugt die Haarfollikel und kommt zumeist im Pubertätsintervall der betroffenen Personen zum Ausbruch. Die mit ihm verbundenen, oft erheblichen Hautläsionen sind bestenfalls unschön, können den Patienten aber auch seelisch schwer belasten.

55

Auch Lantibiotika sind bereits als Therapeutika gegen mikrobiell verursachte Hautleiden, namentlich Akne, vorgeschlagen worden. Nachteilig ist, daß diese Zubereitungen nur kurzzeitig stabil sind.

60

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung war also, Zubereitungen und Verfahren zur Verfügung zu stellen, welche diesem Mißstand abhelfen.

Stabilisierung von parfümierten kosmetischen Zubereitungen

Aus der DE-OS 39 38 140 sind kosmetische Zubereitungen, nämlich Desodorantien, mit einem wirksamen Gehalt an Lantibiotika bekannt. Die dort beschriebenen Zusammensetzungen zeichnen sich durch hervorragende Wirkung und Verträglichkeit aus.

65

Die dort beschriebenen kosmetischen Desodorantien haben jedoch den Nachteil, daß auf bisher noch nicht

erschöpfend geklärte Weise ein Zusatz an Parfümbestandteilen die desodorierende Wirksamkeit der Lantibiotika in unerwünschter Weise herabsetzt. Da fast alle Kosmetika, ob desodorierend oder nicht, Parfümbestandteile enthalten, stellt diese Wirkungsminderung ein erhebliches Problem dar.


Eine weitere Aufgabe der Erfindung bestand also darin, die schädliche Einwirkung von Parfümbestandteilen auf Wirkstoffkomponenten in kosmetischen Zubereitungen zu unterbinden.

5

Darlegung der Erfindung

Es war erstaunlich und für den Fachmann nicht vorhersehbar, und darin liegt die Lösung all dieser Aufgaben begründet, daß Kombinationen aus Imidazol und/oder einem oder mehreren Derivaten des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel haben können

10



15

20

25

— wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$R_1 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_2 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_3 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_4 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

30

— wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste $-CH_2-CH_2-NR_5R_6$ und $-CH_2-CH(NR_5R_6)-COOR_7$ repräsentieren kann, wobei

35

$R_5 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_6 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_7 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

und einem Lantibiotikum oder einem Gemisch aus mehreren Lantibiotika

40

— bei der Lagerung stabil sein würden,

— eine genügend hohe Halbwertszeit auf der Haut besitzen würden,

— zur Anwendung als Kosmetikum geeignet sein würden,

— Wechselwirkungen zwischen Lantibiotika und Parfümbestandteilen nicht auftreten lassen

45

— bei der Anwendung in Kosmetika die geeignete Stabilität aufweisen würden,

— selektiv gegen gerucherzeugende Mikroorganismen wirksam sein würden,

— die symbiontische Mikroflora der Haut schonen würden,

— auch bei der Verwendung von Parfümkomponenten voll aktiv sein würden

— eine deutliche Verbesserung der Deowirkung gegenüber den imidazolfreien Zusammensetzungen erzielen würden,

50

— bei der Anwendung als Konservierungsmittel die geeignete Stabilität aufweisen würden,

— bei der Anwendung in Lebensmitteln die geeignete Stabilität aufweisen würden.


Insbesondere war erstaunlich, daß die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen nicht nur für kosmetische Zwecke geeignet sind, sondern überdies wirkungsvoller und schonender sind als die Zusammensetzungen des Standes der Technik.

55

Erfindungsgemäß ist auch die Verwendung eines oder mehrerer Derivate des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel aufweisen

60

65



15 — wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$R_1 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_2 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_3 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_4 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

20 — wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste $-CH_2-CH_2-NR_5R_6$ und $-CH_2-CH(NR_5R_6)-COOR_7$ repräsentieren kann, wobei

$R_5 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_6 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

25 $R_7 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

als wirksames Prinzip in kosmetischen Desodorantien.

Lantibiotika an sich sind seit vielen Jahren bekannt. Es sind Polypeptide, die von Mikroorganismen synthetisiert werden und sich durch Vertreter der Aminosäuregruppe der Lanthionine als Strukturelement in der


30 Peptidsequenz auszeichnen.

Die Lanthionine haben folgende Strukturen:

$HOOC-CH(NH_2)-CH_2-S-CH_2-CH(NH_2)-COOH$

andere Schreibweise:

35 $H_2N-\text{ala}-S-\text{ala}-COOH$ (meso-Lanthionin)




sowie

$HOOC-CH(NH_2)-CH_2-S-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$

45 andere Schreibweise:

50 $H_2N-\text{ala}-S-\text{aba}-COOH$ (threo-Methyl-Lanthionin)



55

Mit diesen Lanthioninen werden in den Lantibiotika Ringstrukturen gebildet.


Beispiele für Lantibiotika sind Nisin, Epidermin, Subtilin, Cinramycin, Duramycin, Ancovenin, Gallidermin, Pep 5.

60 Die vorgenannten Stoffe sind an sich bekannt und können unter den Registraturnummern der Chemical Abstracts ermittelt werden:


65

Nisin:	1414-45-5	
Epidermin:	99165-17-0	
Subtilin:	1393-38-0	
Pep 5:	110655-58-8	
Duramycin:	1391-36-2	5
Ancovenin:	88201-41-6	
Gallidermin:	117978-77-5	

Nisin beispielsweise ist ein Peptid aus 34 Aminosäuren, welches von *Streptococcus lactis* synthetisiert wird. Nisin besitzt folgende Aminosäuresequenz (Primärstruktur): 10




Komplexanden und/oder Emulgatoren als Konservierungsmittel zu verwenden.
Imidazol ist durch die Strukturformel



gekennzeichnet. Imidazol ist ebenfalls für den Warmblüter praktisch ungiftig, wirkt allerdings bei niederen Tieren als Antimetabolit gegen Histamin und Nicotinsäure. Gewisse Derivate des Imidazols werden als Antimykotika verwendet.

20 Derivate des Imidazols, welche erfindungsgemäß ebenfalls verwendet werden können, sind solche der allgemeinen Strukturformel



wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$R_1 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_2 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

40 $R_3 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_4 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NR}_5\text{R}_6$ und $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NR}_5\text{R}_6)-\text{COOR}_7$ repräsentieren kann, wobei

45 $R_5 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$


$R_6 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_7 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten.


Unter diesen Derivaten des Imidazols sind diejenigen bevorzugt, welche wasser- und/oder alkohollöslich sind. Besonders bevorzugt sind jene Derivate, bei welchen $R_1 = \text{H}$ ist.

50 Insbesondere ist vorteilhaft, den underivatisierten Grundkörper ($R_1-R_4 = \text{H}$) des Imidazols zu verwenden.

Vorteilhaft sind auch die Derivate Histidin



und Histamin,



Die Wirksamkeit ausgewählter erfindungsgemäßer Zusammensetzungen nimmt in der folgenden Reihenfolge ab: 15

Imidazol (unsubstituiert) > Histamin > Histidin.

Natürlich ist dem Fachmann klar, daß die Verwendung von Histamin in Produkten, die in unmittelbarem Kontakt mit dem menschlichen oder tierischen Organismus, also etwa Kosmetika und Lebensmittel, nicht unbedenklich wäre, da Histamin als Gewebshormon unerwünschte Reaktionen zeitigen kann: Histamin tritt vermehrt bei Allergien und Anaphylaxien auf. 20

Die Verwendung der erfindungsgemäßen Kombination aus Histamin und Lantibiotika sollte daher der ärztlichen Aufsicht unterliegen.

Die erfindungsgemäßen Kombination sind vorteilhaft durch einen Gehalt von 0,01 – 99,99 Gew.-% einer Imidazolkomponente und 99,99 – 0,01 Gew.-% eines Einzelstoffes oder eines Gemisches aus der Gruppe der Lantibiotika, bezogen auf das Gesamtgewicht der Kombination, gekennzeichnet. 25

Die erfindungsgemäßen Kombination sind insbesondere vorteilhaft durch einen Gehalt von 0,1 – 99,9 Gew.-% einer Imidazolkomponente und 99,9 – 0,1 Gew.-% eines Einzelstoffes oder eines Gemisches aus der Gruppe der Lantibiotika, bezogen auf das Gesamtgewicht der Kombination, gekennzeichnet. 30

Die erfindungsgemäßen Kombination sind ganz besonders vorteilhaft durch einen Gehalt von 1,0 – 99,0 Gew.-% einer Imidazolkomponente und 99,0 – 1,0 Gew.-% eines Einzelstoffes oder eines Gemisches aus der Gruppe der Lantibiotika, bezogen auf das Gesamtgewicht der Kombination, gekennzeichnet. 35

In den endgültigen Zubereitungen liegen die Lantibiotika bevorzugt in Konzentrationen von 0,1 – 10000 ppm vor. Besonders bevorzugt liegen die Lantibiotika in den endgültigen Zubereitungen in Konzentrationen von 0,1 – 750 ppm, ganz besonders bevorzugt in Konzentrationen von 0,5 – 400 ppm, vor. Die Konzentrationsangaben beziehen sich jeweils auf den Gehalt an reinem Wirkstoff und auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung. 40

Als besonders vorteilhaft haben sich Formulierungen mit einem wirksamen Gehalt an Nisin, Epidermin und/oder Gallidermin herausgestellt. Aber auch die anderen genannten Lantibiotika sind gut für die erfindungsgemäße Verwendung geeignet.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, Nisin zu verwenden.

Es ist möglich und gegebenenfalls vorteilhaft, ein Gemisch an Lantibiotika als wirksames Prinzip der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen einzusetzen. 45

Es ist besonders vorteilhaft, die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf einen pH-Bereich von 2,5 – 6,5 abzupuffern. Besonders günstig ist es, den pH-Wert in einem Bereich von 3,5 – 4,8 zu wählen.

Die Konzentrationen an Imidazol betragen vorteilhaft 0,01 – 5,00 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt 0,10 – 2,00 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 0,25 – 1,00 Gew.-%. 50

Insbesondere sind Zusammensetzungen vorteilhaft, in welchen Kombinationen mit einem Gehalt von

0,1 – 10000 ppm Lantibiotika, insbesondere Nisin, und

0,01 – 5,00 Gew.-% Imidazol,

bevorzugt

2,0 – 750 ppm Lantibiotika, insbesondere Nisin, und

0,10 – 2,00 Gew.-% Imidazol,

besonders bevorzugt

5,0 – 400 ppm Lantibiotika, insbesondere Nisin, und

0,25 – 1,00 Gew.-% Imidazol,

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthalten sind. 60

Insbesondere bevorzugt sind solche Formulierungen, welche 0,4 – 0,6 Gew.-% Imidazol oder dessen Derivate enthalten.

Parfümöle, die insbesondere Lantibiotika nachhaltig deaktivieren, sind in Tabelle 1 aufgeführt. Liegen aber Lantibiotika in Kombination mit Imidazol oder dessen Derivaten vor, so ist die Destabilisierung kompensiert. 65


Tabelle 1

5	Aldehyd C12	Hydroxycitronellol
	Allylamylglycolat	Isoeugenol
	Ambrettolid	Isoraldein 70
	Amylzimtaldehyd	Jonal
	Anisaldehyd	Lilial (Firmenich)
	Aurantesin	Lyrat
10	Benzylacetat	Methyldihydrojasmonat
	Benzylsalicylat	Moschusketon
	Castoreum	p-Hydroxybenzylacetat
	Cedrylketon	Patchouliöl
	Eugenol	Phenylethylalkohol
15	Florol (Firmenich)	Phenylethylphenylacetat
	Gamma Decalacton	Phenylethylprivalat
	Geraniol	Tagetesöl
	Geraniumöl Bourbon	Terpentinöl
20	Geranylacetat	Vertosine
	Helosine	Ylang-Ylang-Öl
	Hexenylsalicylat	Zibeth
	Hydrocarboresin	Zimtaldehyd
25	Hydroxycitronellal (Firmenich)	Zimtalkohol

Außer den anders gekennzeichneten Parfümölen werden die in Tabelle 1 aufgeführten Parfümöle von der Firma Haarmann & Reimer vertrieben.

Die Stabilisierung gegenüber den in Tabelle 1 genannten Substanzen wird erfindungsgemäß beansprucht, soll aber nicht darauf beschränkt sein.

Erfindungsgemäß ist also auch die Verwendung eines oder mehrere Derivate des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel aufweisen



— wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$\text{R}_1 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$\text{R}_2 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$\text{R}_3 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$\text{R}_4 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

— wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NR}_5\text{R}_6$ und $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NR}_5\text{R}_6)-\text{COOR}_7$

repräsentieren kann, wobei

$\text{R}_5 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$\text{R}_6 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$\text{R}_7 = \text{H}, \text{C}_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

zur Stabilisierung von Lantibiotika.

Die desodorierenden kosmetischen Mittel gemäß der Erfindung kann in Form eines aus Aerosolbehältern, Quetschflaschen oder durch eine Pumpvorrichtung versprühbaren Präparates vorliegen oder in Form einer mittels Roll-on-Vorrichtungen auftragbaren flüssigen Zusammensetzung, jedoch auch in Form einer aus normalen Flaschen und Behältern auftragbaren W/O- oder O/W-Emulsion, z. B. einer Creme oder Lotion. Weitere kosmetische Desodorantien können in Form von desodorierenden Tinkturen, desodorierenden Intimreinigungsmitteln, desodorierenden Shampoos, Deo-Seife, desodorierenden Dusch- oder Badezubereitungen, desodorierenden Pudern oder desodorierenden Pudersprays vorliegen. Es können aber auch übliche Deo-Stift-Grundmassen als Träger für feste Zubereitungen und Stifte dienen.

Als übliche kosmetische Trägerstoffe zur Herstellung der erfindungsgemäßen desodorierenden Mittel können neben Wasser, Äthanol und Isopropanol, Glycerin und Propylenglykol hautpflegende Fett- oder fettähnliche Stoffe, wie Partialglyceride von Fettsäuregemischen, Ölsäuredodecylester, Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol und 2-Octyldodecanol, in den für solche Präparate üblichen Mengenverhältnissen eingesetzt werden sowie schleimbildende Stoffe und Verdickungsmittel, z. B. Methylcellulose, Polyacrylsäure, Polyvinylpyrrolidon, daneben aber auch in kleinen Mengen cyclische Silikonöle (Polydimethylsiloxane) sowie flüssige Polymethylphenylsiloxane niedriger Viskosität. 5

Als Treibmittel für aus Aerosolbehältern in Form eines Sprühstrahls bei Betätigung des Ventils versprühbare desodorierende kosmetische Mittel gemäß der Erfindung sind die üblichen bekannten leichtflüchtigen, verflüssigten Treibmittel, beispielsweise Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Isobutan) geeignet, die allein oder in Mischung miteinander eingesetzt werden können. Auch Druckluft ist gegebenenfalls vorteilhaft zu verwenden. 10

Als Emulgatoren zur Herstellung der erfindungsgemäßen desodorierenden kosmetischen Mittel, die vorzugsweise als flüssige Zubereitungen mittels einer Roll-on-Vorrichtung auf die gewünschten Hautbereiche aufgetragen werden sollen, und die in den Mitteln in geringer Menge (z. B.) 2 bis 5 Gewichts-%, bezogen auf die Gesamt-Zusammensetzung, verwendet werden können, haben sich nichtionogene Typen, wie Polyoxyäthylenfettalkoholäther, z. B. Cetostearylalkoholpolyäthylenglykoläther mit 12 bzw. 20 angelagerten Äthylenoxid-Einheiten pro Molekül Cetostearylalkohol, sowie Sorbitanester und Sorbitanester-Äthylenoxid-Verbindungen (z. B. Sorbitanmonostearat und Polyoxyäthylensorbitanmonostearat) als auch langkettige höhermolekulare wachsartige Polyglykoläther als geeignet erwiesen. 15

Zusätzlich zu den genannten Bestandteilen können den desodorierenden kosmetischen Mitteln gemäß der Erfindung, deren pH-Wert vorzugsweise z. B. durch übliche Puffergemische auf 2,5 bis 6,5, insbesondere 3,5 bis 4,8, eingestellt wird, Parfüm, Farbstoffe, Antioxidantien (z. B. alpha-Tocopherol oder Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-Tert.-butyl-4-methylphenol in Mengen von 0,01 bis 0,03%, bezogen auf die Gesamt-Zusammensetzung), Suspensionsmittel, Puffergemische oder andere übliche kosmetische Grundstoffe, wie Triäthanolamin oder Harnstoff, beigemischt werden. 20

Zur Parfümierung sind gegebenenfalls auch solche Substanzen und Parfümöle geeignet, die stabil sind, die Haut nicht reizen und bereits als solche antibakterielle (bakteriostatische) Eigenschaften besitzen. 25

Es ist jedoch im Einzelfalle abzuwägen, ob der Vorteil, den die hochselektive antimikrobielle Wirkung der Lantibiotika und insbesondere der erfindungsgemäßen Kombinationen bietet, durch unter Umständen geringerselektive Wirkung anderer Stoffe gemindert werden soll, oder nicht. 30

Die Erfindung ist aber nicht auf die genannten Zubereitungen und Mittel, Hilfsstoffe und Trägersubstanzen beschränkt.

Die jeweils einzusetzenden Mengen an kosmetischen Trägerstoffen und Parfüm können in Abhängigkeit von der Art des jeweiligen Produktes vom Fachmann durch einfaches Ausprobieren leicht ermittelt werden.

Die Herstellung der kosmetischen Mittel erfolgt abgesehen von speziellen Zubereitungen, die in den Beispielen jeweils gesondert vermerkt sind, in üblicher Weise, zumeist durch einfaches Vermischen unter Rühren, gegebenenfalls unter leichter Erwärmung. Sie bietet keine Schwierigkeiten. Für Emulsionen werden Fettphase und die Wasserphase z. B. separat gegebenenfalls unter Erwärmen hergestellt und dann emulgiert. 35

Ansonsten sind die üblichen Maßregeln für das Zusammenstellen von kosmetischen Formulierungen zu beachten, die dem Fachmann geläufig sind. 40

Die erfindungsgemäßen Kombinationen können auf einfache Weise in die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eingearbeitet werden. Bevorzugt werden sie in gelöster Form (z. B. als wäßrige, alkoholische oder alkoholisch-wäßrige Lösung) den übrigen Bestandteilen der Formulierungen zugesetzt. Ganz besonders vorteilhaft aber ist es, Lantibiotika in sogenannte Pudersprays einzuarbeiten. Vorteilhaft ist es auch, Zusatzstoffe zu vermeiden, welche die natürliche Mikroflora schädigen können, da die erfindungsgemäßen Kombinationen für sich selektiv die geruchserzeugenden Mikroorganismen reduzieren. 45

Sollen die erfindungsgemäßen Kombinationen in Pudersprays eingearbeitet werden, so können die Suspensionsgrundlagen dafür vorteilhaft gewählt werden aus der Gruppe Aerosil, Kieselgur, Kaolin, Talkum, modifizierte Stärke, Titandioxid, Zinkoxid, Seidenpulver, Nylonpulver, Polyethylenpulver und verwandten Stoffen.

Die folgenden Beispiele dienen dazu, die Erfindung zu beschreiben, ohne daß beabsichtigt ist, die Erfindung auf diese Beispiele zu beschränken. 50

Parfümkompositionen

Parfüm Nr. 1

Benzylacetat	4,0 Gew.-%	55
Geraniol	5,0 Gew.-%	
Phenylethylalkohol	9,0 Gew.-%	
diverse andere Riechstoffe, ad	100,0 Gew.-%	60

65

Parfüm Nr. 2

	Benzylacetat	5,4 Gew.-%
	Geraniol	8,0 Gew.-%
5	Ylang-Ylang-Öl	8,4 Gew.-%
	diverse andere Riechstoffe, ad	100,0 Gew.-%

Parfüm Nr. 3

	Benzylacetat	5,0 Gew.-%
	Geraniol	12,0 Gew.-%
	Hydroxycitronellal	7,0 Gew.-%
15	diverse andere Riechstoffe, ad	100,0 Gew.-%

Beispiel 1

Pumpspray

	Nisin (reine Substanz)	0,025 g
	Imidazol	5,000 g
	Ethanol pharm. (96%)	354,875 g
25	Parfüm 1	10,000 g
	Farbstoff	nach Belieben
	Wasser, auf	1000,000 g

Beispiel 2

Pumpspray

	Epidermin	0,010 g
	Imidazol	3,500 g
	Ethanol pharm. (96%)	354,875 g
	Parfüm 1	10,000 g
	Farbstoff	nach Belieben
40	Wasser, auf	1000,000 g

Beispiel 3

Deo-Roller (Roll-on)

	Nisin	0,150 g
	Imidazol	8,000 g
	Hydroxyethylcellulose	5,000 g
50	Propylenglycol	5,000 g
	Ethanol pharm. (96%)	355,850 g
	Parfüm 2	10,000 g
	Farbstoff	nach Belieben
55	Wasser, auf	1000,000 g

Beispiel 4

Deo-Roller (Roll-on)

Epidermin	0,120 g	5
Imidazol	6,500 g	
Hydroxyethylcellulose	5,000 g	
Propylenglycol	5,000 g	
Ethanol pharm. (96%)	355,850 g	
Parfüm 2	10,000 g	10
Farbstoff	nach Belieben	
Wasser, auf	1000,000 g	

Beispiel 5

Spray

Nisin	0,200 g	20
Imidazol	1,500 g	
Ethanol pharm. (96%)	150,000 g	
Propylenglycol	50,000 g	
Dimethylether	300,000 g	
Parfüm 3	10,000 g	25
Wasser, auf	1000,000 g	

Beispiel 6

Spray

Epidermin	0,150 g	
Imidazol	2,000 g	35
Ethanol pharm. (96%)	150,000 g	
Propylenglycol	50,000 g	
Dimethylether	300,000 g	
Parfüm 3	10,000 g	
Wasser, auf	1000,000 g	40

Beispiel 7

Spray

Nisin	0,180 g	
Imidazol	17,000 g	
Ethanol pharm. (96%)	497,160 g	
2-Octyldodecanol	2,660 g	50
Parfüm 1	10,000 g	
Dimethylether, auf	1000,000 g	

Beispiel 8

Spray

Epidermin	0,150 g	60
Imidazol	13,800 g	
Ethanol pharm. (96%)	497,160 g	
2-Octyldodecanol	2,660 g	
Parfüm 1	10,000 g	
Dimethylether, auf	1000,000 g	65

Beispiel 9

	Nisin	1,200 g
	Imidazol	32,000 g
5	Cetylstearylalkohol	20,000 g
	2-Octyldodecanol	20,000 g
	Kaolin	200,200 g
	Talkum	200,200 g
10	Aerosil	48,200 g
	Parfüm 3	10,000 g
	Reisstärke, auf	1000,000 g

Beispiel 10

	Epidermin	1,000 g
	Imidazol	27,000 g
20	Cetylstearylalkohol	20,000 g
	2-Octyldodecanol	20,000 g
	Kaolin	200,200 g
	Talkum	200,200 g
	Aerosil	48,200 g
25	Parfüm 3	10,000 g
	Reisstärke, auf	1000,000 g

Beispiel 11

Waschgelkonzentrat

	Nisin	9,000 g
	Imidazol	17,000 g
35	Cocoamidopropylbetain	613,300 g
	Tipa-Laurylethersulfat	306,700 g
	Kochsalz	nach Belieben
	Parfüm 2	40,000 g
40	Farbstoff	nach Belieben
	Citronensäure	1,000 g
	Glycerin	10,000 g
	Wasser, auf	1000,000 g

Beispiel 12

Waschgelkonzentrat

50	Epidermin	7,000 g
	Imidazol	12,000 g
	Cocoamidopropylbetain	613,300 g
	Tipa-Laurylethersulfat	306,700 g
	Kochsalz	nach Belieben
55	Parfüm 12	40,000 g
	Farbstoff	nach Belieben
	Citronensäure	1,000 g
	Glycerin	10,000 g
60	Wasser, auf	1000,000 g

Beispiel 13

Puderspray I

a) Suspensionsgrundlage

Polymethylsiloxan (Cyclomethicone)	72,000 g	
Talkum	24,000 g	
Bentonitgel IPM	3,000 g	
Nisin	1,000 g	10
Imidazol	5,000 g	
Parfüm 1	2,500 g	

b) fertiger Spray

Suspensionsgrundlage I	20,000 g	
Propan/Butan	80,000 g	
		20

Beispiel 14

Puderspray II

a) Suspensionsgrundlage

Polymethylsiloxan (Cyclomethicone)	72,000 g	
Titandioxid	24,000 g	
Bentonitgel IPM	3,000 g	
Nisin	1,000 g	30
Imidazol	8,000 g	
Parfüm 3	2,000 g	

b) fertiger Spray

Suspensionsgrundlage I	20,000 g	
Propan/Butan	80,000 g	
		40

Beispiel 15

Puderspray III

a) Suspensionsgrundlage

Polymethylsiloxan (Cyclomethicone)	72,000 g	
Seidenpulver	24,000 g	
Bentonitgel IPM	3,000 g	
Nisin	1,000 g	50
Imidazol	6,000 g	
Parfüm 2	2,000 g	

b) fertiger Spray

Suspensionsgrundlage I	20,000 g	
Propan/Butan	80,000 g	
		60

Die Überlegenheit der vorliegenden Erfindung wird anhand der nachfolgenden Versuche demonstriert. Die Zusammensetzungen gemäß den Beispielen wurden anhand des sogenannten "Sniff-Tests" beurteilt.

Versuch 1

Es wurden erfindungsgemäße Zusammensetzungen gemäß Beispiel 1 gegen einen Placebo, also eine bis auf

den Gehalt an Wirksubstanz identische Zusammensetzung getestet.

Ein Kollektiv von 30 Probanden hatte die Auflage, jeweils eine Achselhöhle mit erfindungsgemäßer Zusammensetzung und die andere mit Placebo zu behandeln. Die Probanden trugen daraufhin drei Stunden lang ein Hemd mit Slipeinlagen unter den Achseln. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Slipeinlagen in separate Flaschen überführt. Der Geruch der Einlagen wurde von drei Prüfpersonen beurteilt. Der Versuch wurde als Doppelblindversuch durchgeführt, so daß weder die Probanden noch die Prüfpersonen wußten, welche Achsel mit welcher Zusammensetzung behandelt worden war.

Es stellte sich heraus, daß die wirkstoffhaltigen Zubereitungen in jeweils 29 von 30 Fällen sensorisch beurteilt besser wirkten als die entsprechenden Placebos. In 1 von 30 Fällen gab die Prüfperson an, behandelte und unbehandelte Proben würden sich nicht voneinander unterscheiden.

Versuch 2

Es wurden erfindungsgemäße Zusammensetzungen gemäß Beispiel 4 (enthaltend Imidazol, Zubereitungen C) gegen damit identische Zusammensetzungen ohne Imidazol (Zubereitungen D) getestet.

Ein Kollektiv von 30 Probanden hatte die Auflage, jeweils eine Achselhöhle mit Zubereitung C und die andere mit Zubereitung D zu behandeln. Die Probanden trugen daraufhin drei Stunden lang ein Hemd mit Slipeinlagen unter den Achseln. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Slipeinlagen in separate Flaschen überführt. Der Geruch der Einlagen wurde von fünf Prüfpersonen beurteilt. Der Versuch wurde als Doppelblindversuch durchgeführt, so daß weder die Probanden noch die Prüfpersonen wußten, welche Achsel mit welcher Zusammensetzung behandelt worden war.


Es stellte sich heraus, daß die Zubereitungen C in jeweils 25 von 30 Fällen sensorisch beurteilt besser wirkten als die Zubereitungen D.

In je 4 von 30 Fällen wurden die Zubereitungen D sensorisch besser beurteilt als die Zubereitungen C.

In 1 von 30 Fällen gab die Prüfperson an, behandelte und unbehandelte Proben würden sich nicht voneinander unterscheiden.

Patentansprüche

1. Kombinationen aus Imidazol und/oder einem oder mehreren Derivaten des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel aufweisen



— wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

R₁ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl,

R₂ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl,

R₃ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl,

R₄ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl bedeuten,

— wobei R₄, auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R₁, R₂ und R₃ ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste

—CH₂—CH₂—NR₅R₆ und —CH₂—CH(NR₅R₆)—COOR₇

repräsentieren kann, wobei

R₅ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl,

R₆ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl,

R₇ = H, C₍₁₋₂₅₎ — Alkyl bedeuten,

und einem Lantibiotikum oder einem Gemisch aus mehreren Lantibiotika.

2. Kombinationen nach Anspruch 1, wobei die Lantibiotika gewählt werden aus der Gruppe Nisin, Epidermin, Subtilin, Cinramycin, Duramycin, Ancovenin, Pep 5, Gallidermin.


3. Kombinationen nach Anspruch 1, wobei die Imidazolderivate gewählt werden aus der Gruppe des unsubstituierten Imidazols, des Histidins und des Histamins.

4. Kombination nach Anspruch 1, durch einen Gehalt von

0,01 — 99,99 Gew.-% einer Imidazolkomponente und

9,99 — 0,01 Gew.-% eines Einzelstoffes oder eines Gemisches aus der Gruppe der Lantibiotika, bezogen auf das Gesamtgewicht der Kombination, gekennzeichnet.

5. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei die Lantibiotika in einem Gehalt von 0,1–10000 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, vorliegen.
6. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei die Lantibiotika in einem Gehalt von 0,1–750 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen vorliegen.
7. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei die Lantibiotika in einem Gehalt von 0,5–400 ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen vorliegen. 5
8. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei das oder die Imidazolderivate in einer Konzentration von 0,01–5,00 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen vorliegen.
9. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei das oder die Imidazolderivate in einer Konzentration von 0,10–2,00 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen vorliegen. 10
10. Zubereitungen, enthaltend Kombinationen nach Anspruch 1, wobei das oder die Imidazolderivate in einer Konzentration von 0,4–0,6 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen vorliegen.
11. Zubereitungen nach einem der Ansprüche 1–10, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Form von Deo-Sprays, Roll-ons, Pumpsprays, Tinkturen, Intimreinigungsmittel, Shampoos, Dusch- oder Badezubereitungen, Pudern, Pudersprays oder Deo-Stifte vorliegen.
12. Verwendung eines oder mehrere Derivate des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel aufweisen 15



– wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$R_1 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_2 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_3 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_4 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

– wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste

$-CH_2-CH_2-NR_5R_6$ und $-CH_2-CH(NR_5R_6)-COOR_7$

repräsentieren kann, wobei


$R_5 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_6 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_7 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl}$ bedeuten,

zur Stabilisierung von Lantibiotika.

13. Verwendung eines oder mehrere Derivate des Imidazols, welche folgende allgemeine Strukturformel aufweisen



– wobei die Reste folgende Bedeutung haben können:

$R_1 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_2 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_3 = H, C_{(1-25)} - \text{Alkyl},$

$R_4 = H, C_{(1-25)}$ — Alkyl bedeuten,

— wobei R_4 , auch, und zwar bevorzugt dann, wenn R_1, R_2 und R_3 ein Wasserstoffatom darstellen, die Reste

$-CH_2-CH_2-NR_5R_6$ und $-CH_2-CH(NR_5R_6)-COOR_7$

repräsentieren kann, wobei

$R_5 = H, C_{(1-25)}$ — Alkyl,

$R_6 = H, C_{(1-25)}$ — Alkyl,

$R_7 = H, C_{(1-25)}$ — Alkyl bedeuten,

als wirksames Prinzip in kosmetischen Desodorantien.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ ~~FADED~~ TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ ~~LINE~~S OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.